



# رسائل حملة اللقاح الوطنية الشاملة من 21 لغاية 30 نيسان 2024

الأطفال  
دون  
خمس سنوات



## لقوّا أطفالكم الآن.. ليبقوا بأمان

### اللّقاح المستخدم:

كافّة لقاحات برنامج التلقيح الوطني الموسّع  
إضافة إلى إعطاء فيتامين A للأطفال المراجعين  
من بداية الشهر ٧ حتّى ٥ سنوات



### الرسائل الواجب إيصالها للجمهور عن اللقاحات:

- برنامج اللقاح الوطني برنامج عريق بدأ منذ ١٩٧٨ وقد أثبت فعاليته ونجاحه وكسب ثقة المجتمع.
- تلقيح الطفل في المواجه المقررة يحمي الطفل والآخرين من الإصابة بالأمراض المشتملة باللّقاح (شلل الأطفال، الحصبة والحسبة الألمانية، الدفتيريا، الكزاز، السعال الديكي، السل، أمراض المستدمية النزلية، التهاب الكبد البائي والنكاف).
- قد تسبب الإصابة بالأمراض السابقة مرضًا شديداً أو إعادة عقابيل مدى الحياة وحتى الوفاة.
- من المهم وخاصة للأطفال الذين دون عمر ٥ سنوات أن يتلقوا لقاحاتهم في المواجه المقررة لأن أجهزتهم المناعية في هذا العمر لم تكون بعد الدافعات اللاحمة لمكافحة الأمراض التي يمكن الوقاية منها باستخدام اللقاحات.
- حصول أطفالك على التلقيح يكفل لك وأسرتك حماية ضد فاشيات الأمراض المشتملة باللّقاح إذا انتشرت في بلدك أو أثناء السفر.
- اللّقاح يوفر الحماية للأطفال والمجتمع، وإن التهابون في إعطاء اللّقاح للطفل يضر بصحته والمجتمع.
- إذا تخلف الطفل عنأخذ أحد اللقاحات حسب جدول التلقيح الوطني، فيجبأخذ اللّقاح في أقرب وقت ممكن.
- اللّقاح المستخدم معتمد من وزارة الصحة كما أنه معتمد من قبل المنظمات الدولية.
- اللّقاح آمن وفعال مجاني، تخضع اللقاحات لمعايير سلامة عالية وت تخضع للمراقبة الشديدة من بداية عملية التطوير حتى الوقت الذي تصل فيه إلى الطفل.
- من الشائع جداً أن يتعرض الأطفال إلى إزعاجات بسيطة بعدأخذ اللّقاح.
- قد تحدث بعض التأثيرات الجانبية التالية لإعطاء اللّقاح (الحمى الخفيفة، الألم، التورم بمكان الحقن وتهيج الطفل) وهي خفيفة وعابرة وسرعان ما تختفي.
- أحضر الطفل إلى المركز الصحي في حال استمرار التأثير الجانبي لأكثر من يوم أو يومين أو في حال إصابته بمرض شديد.
- حرصاً على صحة الأطفال وإعطائهم اللقاحات في المواجه المحددة يرجى الاحتفاظ ببطاقات التلقيح الخاصة بهم.
- يرجى إحضار بطاقات اللّقاح إن وجدت وفي حال عدم توفرها سيتم تزويدهم ببطاقة جديدة.
- ضرورة استكمال جرعات لقاحات الأطفال كافة، لأن: عدم الاستكمال = عدم التلقيح.
- يتم تقديم خدمة اللّقاح بالمراكز الصحية والفرق الجوالة (يوجد معهم مهام من مديريات الصحة).
- جميع فرق التلقيح ترتدي لباساً موحداً.
- جميع عناصر التلقيح مؤهلين ومدرّبين.

### الحالات التي لا تمنع اللّقاح:

- ارتفاع درجة حرارة الطفل ٣٨,٥ درجة مئوية أو أكثر.
- الأمراض المنبهة التي تستدعي دخول المستشفى.
- العلاج بالكورتيزون لمدة أكثر من ١٥ يوماً.
- الأمراض المثبطة للمناعة.
- الأدوية المثبطة للمناعة.
- التحسس لجرعة لقاح سابقة.

## الرسالة الأساسية:

يرجى من الأهالي الكرام مراجعة المراكز الصحية أو الفرق الجوالة مصطحبين أطفالهم دون عمر الخامس سنوات بغض النظر عن لقاحاتهم الروتينية السابقة أو الحملات مع بطاقات لقاحاتهم من أجل:

- تحري الحالة التلقيحية.
- إعطاء اللقاحات المستحقة.
- إعطاء فيتامين A للأطفال المراجعين من بداية الشهر السابع حتى خمس سنوات.
- وسيتم التزويد ببطاقة جديدة في حال عدم توفرها. ويتم من خلالها أيضاً:
- إعطاء اللقاحات للأطفال المتربسين بأعمار ١٢-٥ سنة
- إعطاء اللقاح الحاوي على الكزاز للنساء في سن الإنجاب



## ٣- الحصبة الألمانية:

- تظاهر بحمى مع طفح حطاطي من يوم إلى ثلاثة أيام وتميز بضخامة عقد لمفية قذالية وخلف الأذن وأعراض مفصليّة.
- تسبب العدوى قبل الحمل بفترة قصيرة وأنثاء الثلث الأول للحمل إجهاضاً للجنين أو الوفاة أو العيوب الخلقية متعددة الأعضاء لدى الجنين، تعرف متلازمة الحصبة الألمانية الخلقية CRS.

## ٤- الكزاز:

- مرض حاد يسبب انساماً في الجملة العصبية المركزية عن طريق دخول أبواغ الكزاز إلى الجسم عبر الجروح الملوثة بم مواد تحوي تلك الأبواغ، مثل: الأتربة والغبار والخيوط الجراحية الملوثة. ومعدل الوفاة يتراوح بين ٣٠ - ٩٠٪.
- كزاز الوليد: تظهر الأعراض عند وليد يبدو سوياً في الأيام القليلة الأولى بعد الولادة، ثم تظهر لديه صعوبة في البلع ورفض للرضا عن يليه عجز عنها بسبب الضز (تشنج العضلات الماضفة) يترقى المرض إلى تيبس عام مع تشنجات أو اختلالات وقوع تشنجي (تقوس الظهر بسبب التشنج العضلي الشديد).

## ٥- الدفتريا:

- مرض جرثومي حاد. يتظاهر بـ سيلان أنفي، حمى، ألم بلعوم، وهن عام، وتظهر الآفة المميزة كلطخة أو عدة لطخات من غشاء رمادي ملتصق محاط بالتهاب.
- يمكن أن تؤدي لحدوث عسرة تنفس وزرقة ووفاة.
- قد تسبب اعتلال عضلة قلبية وإصابة عصبية وكلوية.

## ٦- النكاف:

- مرض فيروسي حاد، يتصف بحمى وتورم وألم في الغدد اللعابية.
  - قد يسبب التهاب سحايا، التهاب الخصية، التهاب مبيض ويمكن أن يسبب التهاب الدماغ وأحياناً الصمم.
- ٧- السعال الديكي (الشاهوقي):**
- يتميز بنوبات سعال عنيفة متكررة وقد يعقبها شهقة ذات نغمة عالية وكثيراً ما تنتهي نوب السعال بإخراج مخاط رائق ومتماستك.
  - يمكن أن يسبب ذات قصبات ورئة وخاصة عند الرضع، وقد يسبب التهاب الدماغ.

## ٨- الأمراض التي تسببها المستدمية النزلية بـ hib:

- المستدمية النزلية نوع بـ hib هي نوع من البكتيريا المسئولة تقرباً عن التهاب سحايا، ذات رئة، إنفلونزا، التهاب الأذن الوسطى، التهاب مفصل قيحي، والتهاب لسان المزمار في الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ٥ سنوات.
- وحتى مع تناول العلاج يموت طفل واحد من بين كل ٢٠ طفلاً مصاباً بالتهاب السحايا الناجم عن جراثيم المستدمية النزلية من النوع بـ.
- ويعلن المرضى الناجون من بعض الأضرار العصبية الدائمة منها العمى والصمم والتخلّف العقلي. من بين كل خمسةأطفال ناجين يصاب طفل واحد بتلف في الدماغ أو بالصمم.

## ٩- التهاب الكبد B :

- هو مرض يصيب الكبد يتسبب فيه فيروس الالتهاب الكبد ،B وقد يتراوح هذا المرض من علة خفيفة تدوم بضعة أسابيع إلى مرض خطير يستمر مدى الحياة. وقد يتسبب بحصول تشمع كبد ومن ثم سرطان خلية كبدية.

يتم تقديم خدمة اللقاح بالمراكز الصحية الثابتة والفرق الجوالة (يوجد معهم مهمات من مديريات الصحة) والنقاط المحدثة.

## الرسائل الواجب إيصالها للجمهور عن الأمراض المشمولة باللقاء:

### ١- شلل الأطفال:

- من الأمراض المعدية التي تصيب الجهاز العصبي للإنسان.
- ينتقل المرض من براز الشخص المصابة إلى الآخرين عن طريق الأيدي والأطعمة والمشروبات الملوثة بفيروس شلل الأطفال.
- أعراض المرض الأولى هي: الحمى والتعب والصداع وتصباب الرقبة والشعور بألم في الأطراف.
- يصيب هذا المرض الأطفال دون سن الخامسة بالدرجة الأولى.
- لقاح الشلل الفموي يحمي الطفل والمجتمع من مرض شلل الأطفال الخطير الذي يؤدي إلى الإعاقة الدائمة أو الوفاة.
- الطريقة الوحيدة للوقاية من الإصابة بشلل الأطفال هي تلقي اللقاح وهي ممكنة ومتاحة للجميع.

### ٢- الحصبة:

- مرض شديد العدوى، سببه فيروسي، وهو ينتشر عبر القطيرات التنفسية عندما يقوم الشخص المصابة بالسعال أو العطاس، أو التماس المباشر مع مفرزات المريض .
- يتظاهر بحمى شديدة، سيلان الأنف وسعال واحمرار في العينين ثم يظهر بعد عدة أيام طفح يبدأ عادة في الوجه وأعلى العنق وينزل إلى أسفل الجسم.
- اختلالات الحصبة: ذات الرئة الفيروسية والجرثومية، الإسهال الذي قد يؤدي للتجلط، التهاب الأذن الوسطى، التهاب دماغ وأذية عينية.
- قد تسبب الحصبة إعاقة مدى الحياة: أذية دماغية، الصمم، العمى وأحياناً الوفاة.