



النشرة الوبائية الأسبوعية - سوريا
نظام الإنذار المبكر والاستجابة
الأسبوع الوبائي السادس للعام 2026
14-8 شباط 2026

أبرز النقاط

يمثل هذا التقرير البيانات المجموعة من المراكز المبلغة في كامل المحافظات السورية، وذلك بعد دمج البيانات في برنامج الإنذار المبكر والاستجابة EWARS، وشبكة الإنذار المبكر والاستجابة EWARN.

بلغ إجمالي عدد الاستشارات المسجلة في جميع المحافظات الـ 14 (383,432) استشارة.

• كانت الأسباب الرئيسية للمراضة في جميع الفئات العمرية هي المرض الشبيهة بالإنفلونزا بعدد 33698 بنسبة (68.64%) من الاستشارات الكلية، و الإسهال الحاد بعدد 9653 بنسبة (19.66%) من الاستشارات الكلية.


• تم الإبلاغ عن 14 حالة إسهال مائي حاد (AWD) خلال هذا الأسبوع.

• تم الإبلاغ عن 2 حالات شلل رخو حاد (AFP) في كل من دمشق (1) وحلب (1).

• تم تسجيل 10 حالات مشتبه بإصابتها بالحصبة في كل من اللاذقية (3) حلب (2) ريف دمشق (1) دمشق (1) طرطوس (1) دير الزور (1) حمص (1)

مؤشرات الأداء:

• بلغ عدد المواقع المبلغة التي رفعت تقاريرها عبر نظام الإنذار المبكر 1289 موقعًا من أصل 1732 في جميع المحافظات السورية الأربع عشرة، أي بنسبة (74.42%) كما بلغت نسبة الموقوتية 98.37% بين المواقع التي زوّدت النظام بالبيانات خلال هذا الأسبوع (الصورة 1)



المرضاة:



• تم تسجيل 383,432 استشارة في 1289 منشأة صحية ضمن 14 محافظة، من بينها 49096 حالة تُعدّ من الحالات الواجب الإبلاغ عنها عبر نظام الإنذار المبكر (الصورة 2).

• كانت الأسباب الرئيسية للمرض في جميع الفئات العمرية هي الأمراض الشبيهة بالإنفلونزا (68.64%) والإسهال الحاد 9653 (19.66%).

• من بين 49096 حالة مُبلّغ عنها، كانت (24923) 50.76% من الإناث، و (21079) 42.93% من الأطفال دون سن الخامسة.

• شكّلت الحالات الشبيهة بالإنفلونزا (ILI) نسبة 70.14% من الحالات بين الأطفال دون سن الخامسة، و67.51% من الحالات لدى الفئات العمرية فوق 5 سنوات خلال فترة التبليغ (الصورة 3).

• بلغت المراضة النسبية للأمراض الشبيهة بالإنفلونزا (ILI) نسبة 8.79% ولوحظ اتجاه تنازلي بمقدار 0.73% مقارنة بالأسبوع السابق (الصورة 4).

• بلغت المراضة النسبية للإسهال الحاد (AD) نسبة 2.52% ولوحظ اتجاه تنازلي بمقدار 0.22% مقارنة بالأسبوع السابق.

Figure 3: Proportional morbidity by age group





Figure 4: Proportion of Morbidity of top 4 diseases among the total consultation by week






ثالثاً: الأمراض المنتقلة بالمياه

- تم تسجيل 14 حالة من الإسهال المائي الحاد (AWD).
- بلغ العدد الإجمالي لحالات الإسهال الحاد (AD) المبلغ عنها خلال هذا الأسبوع 9653 حالة.


Figure 5: Number of acute diarrhea by week



رابعاً: الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات

- تم الإبلاغ عن 2 حالات شلل رخو حاد (AFP) في كل من دمشق (1) وحلب (1).
- تم تسجيل 10 حالات مشتبه بإصابتها بالحصبة في كل من اللاذقية (3) حلب (2) ريف دمشق (1) دمشق (1) طرطوس (1) دير الزور (1) حمص (1)

Figure 6: Suspected measles cases by week




خامساً: الأمراض التنفسية

- تم الإبلاغ عن 33698 حالة من الأمراض الشبيهة بالإنفلونزا (ILI) خلال هذا الأسبوع.
- تم تسجيل 862 حالة من العدوى التنفسية الحادة الشديدة (SARI)، ويُظهر الاتجاه في الشكل 7، وقد تركزت معظم الحالات في المحافظات التالية:



إدلب (193)، حماة (192)، الحسكة (136)، حلب (123)، دمشق (76)، اللاذقية (34)، درعا (24)، حمص (23)، دير الزور (23)

Figure 7: SARI cases by week



أمراض أخرى


تم الإبلاغ عن 4167 حالات مصتفة ضمن فئة "أمراض أخرى" عبر نظام الإنذار المبكر، وكانت الحالات الأكثر تسجيلاً هي:

ليشمانيا (1642)، الجرب (1028) وقمل (762)

خلال هذا الأسبوع، تم الإبلاغ عن معظم حالات الاشتباه بالليشمانيا من المحافظات التالية:

حلب (891) إدلب (355) حماة (221)

Figure 8: Suspected Leishmaniasis cases by week





تعريف الحالات المستخدمة:

المرض / المتلازمة	تعريف الحالة
التهاب سحايا مشتبه	هجمة مفاجئة من الحمى (≥ 38 م) إبطية مع واحد على الأقل من العلامات: • صلابة نقرة. • انتباج يافوخ (دون السنة من العمر). • تبدل أو انخفاض في مستوى الوعي. • ضعف الرضاعة والتهيج (أكبر من عمر شهرين). • الإعياء أو الوسن. • طفح حطاطي أو نمشي. الاختلاجات: أقل من 6 أشهر وأكثر من 6 سنوات: أية نوبة اختلاجية 6 أشهر إلى 6 سنوات: أية نوبة طويلة موضعية أو نوبتان أو أكثر من اختلاجات معممة خلال فترة 24 ساعة
أمراض أخرى	أي مرض مستجد (حمى صفراء، طاعون، سارس... الخ)، أو ظاهرة مرضية مجهولة السبب وذات تأثير على الصحة العامة، أو مرض سار زاد عدد حالاته عن المتوقع، وخاصة الحالات العقنودية منها (شخصين أو أكثر في نفس العائلة، العمل، المدرسة... الخ).
ابلاغ فوري خلال 24 ساعة دون الانتظار لنهاية الاسبوع	

المرض / المتلازمة	تعريف الحالة
إسهال حاد	حالة تفوط ثلاث مرات أو أكثر لبراز رخو أو مائي خلال 24 ساعة.
إسهال مدمى (شيغلا مشتبه)	حالة إسهال حادة تترافق مع وجود دم مرثي في البراز (ويفضل أن يرى الدم من قبل الطبيب الفاحص).
إسهال مائي حاد (كوليرا مشتبه)	حالة إسهال مائي حاد ومفاجئ يؤدي لحدوث تجفاف سريع وشديد، أو وفاة، مع أو عدم وجود إقياء.
متلازمة يرقانية حادة (التهاب كبد مشتبه)	حدوث يرقان مفاجئ (اصفرار العينين أو الجلد أو وجود بول غامق) وسوء الحالة العامة مع أو بدون حرارة مع غياب وجود أي عوامل أخرى مسببة.
المرض شبيه الأنفلونزا	مرض تنفسي حاد يترافق مع سعال وحمى ($\leq 38^{\circ}$) خلال أسبوع.
الإنتان التنفسي الحاد الشديد	مرض تنفسي حاد يترافق مع سعال وحمى ($\leq 38^{\circ}$) خلال أسبوع ويتطلب إدخال مشفى.
شلل رخو حاد	كل حالة شلل رخو وحاد (بدء مفاجئ) عند طفل دون (15) سنة من العمر، أو أية حالة شلل رخو حاد بأي عمر يشبهه الطبيب بأنها حالة شلل أطفال. (وتستثنى الحوادث الرضية كالسقوط والاصطدام).
حصبة مشتبه	أي شخص لديه حرارة مع طفح حطاطي غير حويصلي مع أحد الأعراض التالية: سعال، سيلان أنف، التهاب ملتحمة أو الأعراض الثلاثة مجتمعة. أو أية حالة يشبه فيها الطبيب.

للتواصل والاستفسار، الرجاء الارسال على الايميل Y.alfarrouh@moh.gov.sy